



Preparación para colonoscopia con PLENVU®

Instrucciones de preparación:

DIETA LÍQUIDA CLARA TODO EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

NADA ROJO O PÚRPURA*****

SON ACEPTABLES:

SOPAS – CALDO CLARO O CALDO

BEBIDAS – TÉ, CAFÉ (SIN LECHE/CREMA EN EL CAFÉ O TÉ), KOOL-AID,

BEBIDAS CARBONATADAS

JUGOS – (SIN PULPA EN NINGÚN JUGO) ARÁNDANO BLANCO, MANZANA, UVA BLANCA,

LIMONADA COLADA – HIELO ITALIANO, PALETAS O GELATINA

CUALQUIER PREGUNTA POR FAVOR LLAME A LA OFICINA AL 943-130 1 O 789-1860

EXT: _____

Serequiere 4 aviso de 8 horas para cancelaciones para evitar un cargo de \$ 100.00

El kit de preparación intestinal plenvu® contiene 3 paquetes para mezclar con agua y un recipiente de mezcla de 16 onzas. Debe completar toda la preparación para garantizar la limpieza más efectiva.

COMIENCE LA PREPARACIÓN: Paso 1 A partir de: 16 HORAS ANTES DE LA HORA DE LLEGADA DE SU PROCEDIMIENTO.

Paso 2 Vierta la **DOSES 1** en el recipiente de mezcla. Agregue agua potable fría a la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle.

Paso 3 Beba TODO el líquido en el recipiente durante 30 minutos.

Paso 4 Beba 16 onzas adicionales de líquidos claros en el mismo recipiente durante 30 minutos.

Continúe teniendo líquidos claros entre ambas dosis, siguiendo la dieta en la parte superior de esta hoja.

Repita los pasos 1-4 usando los paquetes DOSE 2A y 2B 12 horas después de su primera dosis.

NOTA: Debe terminar de beber el vaso final de agua al menos 3 horas, o según las indicaciones, antes de su procedimiento.

El día de su procedimiento:

1. No desayunar de ningún tipo.
2. Continúe bebiendo líquidos claros hasta 4 horas antes de la hora de llegada programada.
3. Todos los medicamentos orales para la diabetes no deben tomarse el día del procedimiento.
4. Los pacientes que toman insulina deben comunicarse con el médico que prescribe la insulina para obtener instrucciones para el día anterior y el día del procedimiento.
5. Tome todos sus medicamentos para el corazón, la presión arterial y las convulsiones como de costumbre con pequeños sorbos de agua.
6. Deje suficiente tiempo para que el laxante termine de funcionar antes de viajar.
7. Debe estar acompañado por un amigo o familiar para conducir o ayudarlo a casa. No se le permitirá conducir el día del procedimiento.